

schülke -t



Antiseptique pour la peau incolore avec un effet de rémanence de 24 heures.

octeniderm® incolore

Notre plus :

- effet de rémanence de 24 heures
- large spectre d'efficacité antiseptique
- efficacité rapide (15 sec. avant les injections)
- très bien toléré par la peau
- listé VAH/DGHM

Domaines d'application

- Pour l'antisepsie cutanée avant la pose de cathéters veineux, les interventions chirurgicales, les injections et les prélèvements de sang, les ponctions ainsi qu'avant les excisions, les poses de canule et les biopsies
- Pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains
- Pour le soin des plaies et des sutures

Méthodes et indications d'application

Antisepsie cutanée avant des injections, des ponctions, des excisions, etc. :

Vaporiser octeniderm® incolore sur la zone cutanée concernée ou la frotter avec un tampon imbibé de cette préparation et respecter le temps d'action. Lors de l'utilisation d'octeniderm® incolore avant les tests de glucose (p. ex. sticks hémogluco), bien laisser sécher la préparation afin d'éviter une éventuelle altération.

Avant des ponctions articulaires et une antisepsie cutanée préopératoire :

- raser la zone cutanée concernée, si nécessaire.
- Baigner ou laver le patient ou la zone cutanée concernée (p. ex. avec octenisan®), si possible une heure avant l'antisepsie cutanée.
- Appliquer octeniderm® incolore à l'aide d'un tampon ou en le vaporisant. Veiller à une humectation complète.

- Si l'on utilise des feuilles d'incision, on veillera à un séchage suffisant avant de coller la feuille afin de ne pas altérer l'adhérence.
- La prudence est particulièrement de mise (séchage suffisant) lorsque l'on utilise un thermocautère ou d'autres appareils électriques après l'application d'octeniderm® incolore.

Soin des plaies et des sutures

Pour le soin des plaies et des sutures, octeniderm® incolore peut être soit appliqué avec un tampon stérile, soit vaporisé directement. On veillera à ce que les quantités résiduelles de la préparation puissent s'écouler ou soient tamponnées. Les sutures opératoires seront, de préférence, tamponnées à l'aide d'un tampon imbibé.

Désinfection hygiénique/chirurgicale des mains

Pendant le temps d'action dans la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains, l'administration par portions d'octeniderm® incolore devrait être faite de manière à ce que les mains restent bien humectées pendant toute la durée d'application.

Efficacité microbiologique

- Bactéricide, y compris contre les mycobactéries (Tb)
 - fongicide
- virucide à effet limité* (y c. les virus VHB, VIH, VHC et herpès simplex)

octeniderm® incolore

Temps d'action

Domaine d'application/Germes	Recommandation pour l'application
Peau pauvre en glandes sébacées (selon certificat VAH/DGHM) : - avant les injections et les prélèvements de sang : - avant les ponctions articulaires : - pour les antiseptiques cutanées pré- et post-opératoires :	15 sec. 60 sec. 60 sec.
Application répétée avant les interventions sur une peau riche en glandes sébacées dans les régions du crâne et du front :	10 min.
Désinfection des mains (selon certificat VAH-/ DGHM) désinfection hygiénique des mains : désinfection chirurgicale des mains :	30 sec.** 3 min.**
virucide à effet limité* (y c. les virus VHB, VIH, VHC et herpès simplex) :	30 sec.

* Selon la recommandation RKI Bundesgesundheitsblatt 01/2004

** Les mains doivent être gardées humides avec la préparation concentrée pendant toute la durée de l'application.

Spécifications

Composition :

100 g de solution contiennent : composants à efficacité médicamenteuse : 0,1 g de dihydrochlorure d'octénidine, 30,0 g de 1-Propanol, 45,0 g de 2-Propanol

Autres composants :
eau purifiée

Données physicochimiques

Aspect :	incolore
Thermostabilité :	stable entre -5 °C et +40 °C
Point d'inflammation :	23,5 °C

Remarques spéciales

octeniderm® incolore étant employé à l'état non dilué, on veillera à humecter complètement les zones cutanées à traiter.

Conserver la préparation hors de portée des enfants. La préparation ne doit plus être employée après la date d'expiration. Inflammable. Ne pas mettre en contact avec des flammes nues ou des sources de chaleur électriques enclenchées.

Eviter impérativement tout contact direct d'octeniderm® incolore avec des supports radiographiques.

Conditionnement / Unités d'emballage

Conditionnement	Unités d'emballage	Référence
Flacon de 250 ml avec bouchon	10 x 250 ml	118 215
Flacon de 1 l	10 x 1 l	114 102

Information écologique

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Expertises et informations

Sur le site Internet www.schuelke.com, vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/toute la littérature existant sur la préparation octeniderm® incolore.

Pour vos questions individuelles :
Customer Care

Tél. : +41 44 466 55 44
E-mail : mail.ch@schuelke.com

octeniderm® incolore • Comp. : 1 mg dihydrochlorure d'octénidine, 300 mg 1ml alcool propylique, 450 mg alcool isopropylique par 1 ml • **Ind** : Désinfection de la peau avant une intervention chirurgicale ou diagnostique, injections, prélèvements de sang et de LCR, ponctions, excisions, pose de canules, biopsies et autres. Désinfection de plaies et lors de sutures. Utilisé lors de la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains. • **Mode d'emploi** : Appliquer ou sprayer jusqu'à humidification complète. Durée d'action : 1 minute en cas d'injections ou de prises de sang, désinfection de la peau pré- et post-opératoire, soins des plaies et sutures. Virus de l'hépatite B : Durée d'action, 2 minutes. Désinfection hygiénique des mains : frotter les mains avec env. 3 ml pendant 30 secondes. Désinfection chirurgicale des mains : frotter 3 à 6 fois 3 ml pendant 5 minutes sur les mains et les avant-bras secs. • **CI** : Ne pas utiliser sur les muqueuses, dans les oreilles ou les yeux. Hypersensibilité. • **EI** : Légère sensation de brûlure. **Catégorie de remise D**. L'information spécialisée complète est publiée dans le Compendium Suisse des Médicaments. • **Conseil sur les produits / l'application** Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt • **Titulaire d'admission** : Schülke & Mayr AG, 8003 Zurich



Schülke & Mayr GmbH est certifiée selon DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 et DIN EN ISO 13485 (n° de reg. 004567-MP23) et dispose d'un système de gestion environnementale validé selon l'ordonnance sur l'éco-audit (n° de reg. D-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Allemagne
Tél. +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zurich, Suisse
Tél. +41 (0) 44 - 466 55 44
Fax +41 (0) 44 - 466 55 33
mail.ch@schuelke.com

Schülke France SARL
94250 Gentilly, France
Tél. +33 (0) 1 - 49 69 83 78
Fax +33 (0) 1 - 49 69 83 85
smfrance.info@airliquide.com